

Lonstar hoby balenie

LONTREL 300

Selektívny, systémovo pôsobiaci listový herbicíd na ničenie odolných dvojkľúčolistových burín v okrasných trávnikoch, obilninách, ovocných sadoch, zelenine a iných poľnohospodárskych plodinách.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok LONTREL* 300 pôsobí ako systémový rastový herbicíd, preniká do rastlín cez listy a byle.

Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu (dekolorácia), následne sa objavuje krútenie listov a stoniek (deformácia) a v priebehu 10-21 dní hynú.

Prvé symptómy sú viditeľné pri optimálnych podmienkach za 3-6 dní po aplikácii prípravku LONTREL 300.

Účinná látka clopyralid sa v pôde rýchlo rozkladá vplyvom činnosti mikroorganizmov.

MECHANIZMUS ÚČINKU

Účinná patrí do skupiny syntetických auxínov.

Je absorbovaná listami a byľami, následne translokovaná akropetálne a bazipetálne s následnou akumuláciou v meristematických pletivách rastlín a prejavujúcim sa „auxínovým“ účinkom.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny:

pichliač roľný, ruman roľný, rumančeky a parumanček nevoňavý, chryzantémovka siatinová, turanec kanadský, lopúchy, podbeľ liečivý, nevädza poľná, výmrv slnečnice a ďalšie buriny z čeľade astrovité, stavikrvy a horčičky, pohánkovec ovíjavý, lucerna siata, ľuľok čierny, ľuľok zemiakový, tetucha kozia a ďalšie buriny z čeľade mrkvovité.

Ododné buriny: hluchavky a kapustovité buriny.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

STARANE FORTE

Postrekový selektívny herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu (EC) pre riedenie vodou určený na postemergentné použitie proti odolným dvojkľúčolistovým burinám v obilninách bez podsevu, kukurici, ciroku, maku, na lúkach a pasienkoch, trávnatých ihriskách, v okrasných trávnikoch a semenných porastoch tráv.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Starane Forte preniká do rastlín cez listy a účinná látka je rýchlo translokovaná.

Účinok prípravku na buriny sa prejaví už za niekoľko hodín po aplikácii.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny:

lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý, hviezdica prostredná, konopnica napuchnutá, stavikrv vtáčí, nezábudka roľná, štiavce.

Stredne citlivé:

povoja plotná, horčica roľná, prhľava malá, starček obyčajný, ľuľok čierny.

Odolné buriny:

veroniky, fialky, maky, výmrv repky, praslička, trváce dvojkľúčolistové buriny (napr. pichliač) a trávy.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.



Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina	Škodlivý činiteľ	Koncentrácia v %	Dávka do 2-4L vody na 100m ²	Čakacia lehota v dňoch	Povolené kombinácie poznámky
trávniky	Buriny		8+6ml		Lontrel 8ml + Starane 6ml na 4L vody